

# TRATTAMENTO LAPAROSCOPICO DELLA STENOSI IPERTROFICA DEL PILORO

## 130 PILOROMIOTOMIE

56 LAPAROSCOPICHE

74 TRANS-OMBELICALI



# DEVICE



# RISULTATI

COMPLICANZE	OPEN SURGERY	LAPAROSCOPIC SURGERY
DEISCENZA PARETE	6	X
PERFORAZIONE	X	X
INFEZIONE PARETE	4	X
SANGUINAMENTO	X	X

# CONCLUSIONI

LE DUE TECNICHE NON HANNO MOSTRATO DIFFERENZE SOSTANZIALI NEL DURATA DELL'INTERVENTO ( 15 +/- 5 min L.S. – 25 +/- 5 min O.S.), NELLA DEGENZA MEDIA POST-OPERATORIA 3-4 gg E NELLA RIPRESA COMPLETA DELL'ALIMENTAZIONE (24-36 h ).

LA TECNICA LAPAROSCOPICA HA MOSTRATO COMPLETA ASSENZA DI COMPLICANZE POST-OPERATORIE DI PARETE !!!

- **NESSUNA DEISCENZA**

- **NESSUNA INFEZIONE**

- **MIGLIORE RISULTATO ESTETICO**

